

AGLIO

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE (1)	DOSE DI F.C. (L O KG/HA)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Pulizia del letto di impianto	Dicotiledoni e graminacee	Glifosate (30,4%)	1,5-3 oppure 1-1,5 + solfato ammonico (2%)	
Pre-emergenza		Pendimetalin (31,7%) (*)	2 – 3	
Post-emergenza		Oxyfluorfen (22%)	0,1 – 0,5	
	Ioxinil (33,2%)	0,2 – 0,6		
	Metazaclor (43,1%)	1,5		
	Graminacee	Setossidim (20%)	1 - 1,5	
		Propaquizafop (9,7%)	1	
		Quizalofop-p-etile (5%)	1-1,5	

(1) Tra le parentesi è indicata la percentuale di s.a. nel formulato commerciale.

ASPARAGO

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE(1)	DOSE DI F.C. (L O KG/HA)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE	
Pre-trapianto Pre-ricaccio Post-raccolta	Dicotiledoni e graminacee	Glifosate (30,4 %)	1,5-3 oppure 1-1,5 + solfato ammonico (2%)		
Pre-trapianto Pre-ricaccio Post-raccolta		Glufosinate ammonio (11,33%)	3-5		
Pre-ricaccio		Metribuzin (35%) Metobromuron (50 %) Pendimetalin (31,7 %) Oxadiazon (34,1%)	1 2 – 3 2 – 3 1,5		(1) E' ammesso un solo intervento annuo
Post-raccolta		Graminacee	Metobromuron (50 %) Propaquizafop (10 %) Oxadiazon (34,1%) Ciclossidim (10,9%) Alossifop R-metile estere (10,6%)		2-3 1 4 1,5 0,7

(1) Tra le parentesi è indicata la percentuale di s.a. nel formulato commerciale.

BIETOLA ROSSA E DA COSTA

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE (1)	DOSE DI F.C. (L o KG/HA)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Pulizia del letto di semina	Graminacee e dicotiledoni	Glifosate (30,4%)	1,5-3 oppure 1-1,5 + solfato ammonico (2%)	
Pre-emergenza		Cloridazon (65%)	3 - 4	
		S-Metolacloclor (86,5)	0,4	
Post-emergenza		Fenmedifam (15,9%)	1,5	Non ammesso su bietola da costa
	Graminacee	Setossidim (20%)	1 - 1,5	

(1) Tra le parentesi è indicata la percentuale di s.a. nel formulato commerciale.

CARCIOFO

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE (1)	DOSE DI F.C. (L o KG/HA)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Pulizia del letto di impianto Pre-trapianto	Dicotiledoni e graminacee	Glifosate (30,4%)	1,5-3 oppure 1-1,5 + solfato ammonico (2%)	Proteggere le foglie con opportuna schermatura; utilizzabile su chiazze di acetosella
Post-trapianto		Oxifluorfen (23,6 %)	1-2	
Pre-ricaccio		Oxadiazon (35,87%)	1-2	
Post-ricaccio		Pendimethalin (31,7 %)	2 – 3	
		Metazaclor (50%)	1,5 – 2	
Post-trapianto Post-ricaccio	Graminacee	Metazaclor (43,1%)	1,5	
Post-trapianto Post-ricaccio	Graminacee	Fenoxaprop-p-etile (6,6 %)	1-1,5	
		Propaquizafop (9,7%)	1	
		Quizalofop-p-etile (5%)	1-1,5	
		Imazametabenz (19,2)	1,5	
		Fluazifop-p-butile (13,3 %)	1-2	
		Setossidim (20 %)	1-2	
Post-ricaccio	Graminacee	Alossifop R-metile estere (10,6%)	0,7	
		Ciclossidim (10,9%)	1,5	

(1) Tra le parentesi è indicata la percentuale di s.a. nel formulato commerciale.

CAROTA

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE (1)	DOSE DI F.C. (L o KG/HA)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Pulizia del letto di semina	Graminacee e dicotiledoni	Glifosate (30,4%)	1,5-3 oppure 1-1,5 + solfato ammonico (2%)	
		Glufosinate ammonio (11,33%)	4-7	
Pre-emergenza		Pendimetalin (31,7%)	2 – 3	
		Clomazone (31,4%)	0,25	
Post-emergenza	Graminacee	Setossidim (20%)	1 - 1,5	
		Ciclossidim (21%)	1 – 1,5	
		Fluazifop-p-butile (13,3%)	1 – 1,5	
		Quizalofop-p-etile (5%)	1-1,5	
		Propaquizafop (9,7%)	1	
	Alossifop R-metil estere (10,6%)	0,7		
	Graminacee e dicotiledoni	Metribuzin (35%)	0,5 –0,7	

(1) Tra le parentesi è indicata la percentuale di s.a. nel formulato commerciale.

CAVOLI

(Cavolfiore, Cavolo bianco, Cavolo broccolo, Cavolo cappuccio, Cavolo cinese, Cavolo di Bruxelles, Cavolo nero, Cavolo rapa, Cavolo rosso, Cavolo verza)

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE(1)	DOSE DI F.C. (L o KG/HA)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Pulizia del letto di impianto	Dicotiledoni e graminacee	Glifosate (30,4 %)	1,5-3 oppure 1-1,5 + solfato ammonico (2%)	
		Glufosinate ammonio (12 %)	4-6	
Pre-trapianto		Napropamide (41,85 %)	2-3	Autorizzato solo su cavolo cappuccio
		Oxifluorfen (23,6 %)	1,5-2,5	
		Pendimethalin (31,7 %)	2 – 3	
		Metazaclor (43,1%)	1,5	
Post-trapianto	Graminacee	Fluazifop-p-butile (13,3 %)	1,0	
		Setossidim (20 %)	1,5	
		Propaquizafop (9,7%)	1	
		Quizalofop-p-etile (5%)	1 – 1,5	
	Ciclossidim (10,9%)	1,5		
	Dicotiledoni	Clopiralid (9,5%)	0,8-1,5	

(1) Tra le parentesi è indicata la percentuale di s.a. nel formulato commerciale.

CETRIOLO

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE (1)	DOSE DI F.C. (L o KG/HA)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Pulizia del letto di semina	Graminacee e dicotiledoni	Glifosate (30,4%)	1,5-3 oppure 1-1,5 + solfato ammonico (2%)	
Pre-emergenza		Trifluralin (44,5%)	0,9 – 1,5	
Post-emergenza	Graminacee	Setossidim (20%) Fluazifop-p-butile (13,3%)	1 – 1,5 1 – 1,5	

(1) Tra le parentesi è indicata la percentuale di s.a. nel formulato commerciale.

CIPOLLA E PORRO

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE(1)	DOSE DI F.C. (L o KG/HA)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Pulizia del letto di impianto	Dicotiledoni e graminacee	Glifosate (30,4%)	1,5-3 oppure 1-1,5 + solfato ammonico (2%)	
Pre-semina		Glufosinate ammonio (11,33%)	4-7	
		Trifluralin (45,8%) (*)	0,9 – 1,5	
Pre-emergenza		Pendimetalin (31,7%) (*) Trifluralin (45,8%) (**)	2 – 3 0,9 – 1,5	(*) Solo su cipolla (**) solo su porro
Post-emergenza	Dicotiledoni	Clorpiralid (9,5%) (*) Oxifluofen (22%)(*)	0,8-1 0,05-0,5	
		Fluazifop-p-butile (13,3%) (*)	1	
	Graminacee	Alossifop-R (10,6%) (*)	0,4 – 1	
		Fenoxaprop-p-etile (12,5%) (*) Quizalofop-p-etile (5%)	1 1-1,5	
		Propaquizafop (9,7) (*)	1	
		Setossidim (20%) (*) Ciclossidim (21%)	1 1,5 1-1,5	

(1) Tra le parentesi è indicata la percentuale di s.a. nel formulato commerciale.

COCOMERO E MELONE

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE (1)	DOSE DI F.C. (L o KG/HA)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Pre-semina (Pulizia del letto di impianto)	Dicotiledoni e graminacee	Glifosate (30,4 %)	1,5-3 oppure 1-1,5 + solfato ammonico (2%)	
Pre-trapianto		Clomazone (31,4%)	0,3	
Post-emergenza	Dicotiledoni	Trifluralin (24 %)	1,5	Autorizzato solo su cocomero
Post-emergenza	Graminacee	Fenoxaprop-p-etile (6,6%) (1)	1-1,5	(1) Autorizzato solo su melone
		Fluazifop- p butile (13,3 %)	1,5-2	Gli interventi chimici sono ammessi solo quando lo sviluppo della coltura non consente più l'accesso ai mezzi meccanici
		Setossidim (20 %)	1-1,5	
		Propaquizafop (10 %)	1	
		Quizalofop-p-etile (5%)	1-1,5	
Alossifop R-metile estere (10,6%)	0,7			

(1) Tra le parentesi è indicata la percentuale di s.a. nel formulato commerciale.

FAGIOLINO

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE (1)	DOSE DI F.C. (L o KG/HA)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Pulizia del letto di semina	Graminacee e dicotiledoni	Glifosate (30,4%)	1,5-3 oppure 1-1,5 + solfato ammonico (2%)	
		Glufosinate ammonio (11,33%)	4-7	
Pre-emergenza		Trifluralin (44,5%)	0,9 – 1,5	
Post-emergenza	Dicotiledoni	Imazamox (3,7%)	1	
	Graminacee	Setossidim (20%)	1 – 1,5	
		Fluazifop-p-butile (13,3%)	1 – 1,5	
		Fenoxaprop-p-etile 86,6%)	1 – 1,5	
		Quizalofop-p-etile (5%)	1 - 1,5	
		Alossifop R-metile estere (10,6%)	0,7	
Ciclossidim (10,9%)	1,5			

(1) Tra le parentesi è indicata la percentuale di s.a. nel formulato commerciale.

FAVA

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE (1)	DOSE DI F.C. (L o KG/HA)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Pulizia del letto di semina	Graminacee e dicotiledoni	Glifosate (30,4%)	1,5-3 oppure 1-1,5 + solfato ammonico (2%)	
Pre-emergenza		Imazetapyr (2,1%) + Pendimetalin (30,1%)	2	
		Pendimetalin (31,7%)	2	
		Imazamox (1,60%)+ Pendimetanil (23,50)	3	
Post-emergenza	Graminacee	Imazamox	0,75	
		Fenoxaprop-p-etile (6,6%)	1 – 1,5	
		Setossidim (20%)	1 – 1,5	
		Fluazifop-p-butile (13,3%)	1 – 1,5	
		Diclofop-metile (27%)	2 – 2,5	

(1) Tra le parentesi è indicata la percentuale di s.a. nel formulato commerciale.

FINOCCHIO

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE (1)	DOSE DI F.C. (L o KG/HA)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Pre-semina Pre-trapianto	Graminacee e dicotiledoni	Glifosate (30,4 %)	1,5-3 oppure 1-1,5 + solfato ammonico (2%)	Pulizia del letto di impianto della coltura
Pre-emergenza		Trifluralin (48 %)	1,5	
Pre-trapianto		Pendimetalin (31,7%)	2 – 2,5	
Post-trapianto Post-emergenza		Pendimetalin (31,7 %)	2-2,5	
Pre-emergenza Pre-trapianto	Dicotiledoni	Oxadiazon (25,5 %)	1,5	
Post-emergenza Post-trapianto	Graminacee annuali e perenni	Fluazifop-p-butile (13,3 %)	1 – 1,5	
		Setossidim (20 %)	1 – 1,5	
		Fenoxaprop-p-etile (6,6 %)	1 – 1,5	
		Alossifop R-metile estere (10,6%)	0,7	
		Ciclossidim (10,9%)	1,5	

(1) Tra le parentesi è indicata la percentuale di s.a. nel formulato commerciale.

INSALATE (lattuga, scarola, radicchio, indivia, cicoria)

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE(1)	DOSE DI F.C. (L o KG/HA)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Pulizia del letto di impianto	Graminacee e dicotiledoni	Glifosate (30,4 %)	1,5-3 oppure 1-1,5 + solfato ammonico (2%)	
		Glufosinate ammonio (11,33 %)	4 - 7	
Pre-trapianto		Oxadiazon (25,5 %)	1,5	Solo su lattuga e indivia
		Trifluralin (44,5 %)	0,9 – 1,5	
Post-trapianto	Graminacee	Propizamide (35,5 %)	2-3	
		Fluazifop- p-butile (13,3 %)	1-2	Solo su lattuga e cicoria
		Setossidim (20 %)	1-2	
		Propaquizafop (9,7 %)	1	
		Alossifop R-metile estere (10,6%)	0,7	
Ciclossidim (10,9%)	1,5			

(1) Tra le parentesi è indicata la percentuale di s.a. nel formulato commerciale.

MELANZANA

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE (1)	DOSE DI F.C. (L o KG/HA)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Pulizia del letto di semina	Graminacee e dicotiledoni	Glifosate (30,4%)	1,5-3 oppure 1-1,5 + solfato ammonico (2%)	
Pre-trapianto		Oxadiazon (25,5%) Pendimetalin (31,7%)	1,5 2 - 3	
Post-trapianto	Graminacee	Setossidim (20%) Fluazifop-p-butile (13,3%) Fenoxaprop-p-etile 86,6%) Ciclossidim (10,9%)	1 – 1,5 1 – 1,5 1 – 1,5 1,5	

(1) Tra le parentesi è indicata la percentuale di s.a. nel formulato commerciale.

P A T A T A

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE(1)	DOSE DI F.C. (L o KG/HA)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Pre-semina (Pulizia del letto di impianto)	Dicotiledoni e graminacee	Glifosate (30,4 %)	1,5-3 oppure 1-1,5 + solfato ammonico (2%)	
		Glufosinate ammonio (11,33 %)	4-6	
Pre-emergenza	Dicotiledoni e graminacee	Metribuzin (35 %)	0,4-0,6	
		Pendimetalin (31,7 %)	2 – 3	
		Metobromuron (50%)	2-3	
		Aclonifen	2 – 2,5	
		Flufenacet (60%)	0,8	
		Clomazone (31,4%)	0,25	
Post-emergenza	Dicotiledoni e graminacee	Metribuzin (35 %)	0,2-0,4	
		Rimsulfuron (25 %)	0,05	
		Metazaclor (43,1%)	1,5	
	Graminacee	Fenoxaprop-p-etile (6,6 %)	1	
		Fluazifop-p-butile (13,3 %)	1-1,5	
		Setossidim (20 %)	1-1,5	
		Ciclossidim (21%)	1-1,2	
		Propaquizafop (9,7 %)	1	

(1) Tra le parentesi è indicata la percentuale di s.a. nel formulato commerciale.

PEPERONE

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE (1)	DOSE DI F.C. (L o KG/HA)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Pulizia del letto di impianto	Dicotiledoni e Graminacee	Glifosate (30,4%)	1,5-3 oppure 1-1,5 + solfato ammonico (2%)	(1) Su infestanti pre-emergenza/post-emergenza (2 foglie vere) localizzato sulla fila. (2) La dose più alta in presenza di infestanti dicotiledoni. (3) Dose per interventi frazionati.
Pre-trapianto		Oxadiazon (25,5%) Pendimetalin (31,7%)	1,5 3 - 4	
Post-trapianto	Dicotiledoni e Graminacee	Clomazone (31,4%) (1)	0,4 - 0,6 (2) 0,3 - 0,4 (3)	
	Graminacee	Fluazifop-p-butile (13,3%)	1	
		Fenoxaprop-p- etile (12,5%) Setossidim (20%) Ciclossidim (10,9%)	1 1 1,5 1,5	

(1) Tra le parentesi è indicata la percentuale di s.a. nel formulato commerciale.

P I S E L L O

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE (1)	DOSE DI F.C. (L o KG/HA)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Pulizia del letto di semina	Graminacee e dicotiledoni	Glifosate (30,4%)	1,5-3 oppure 1-1,5 + solfato ammonico (2%)	
Pre-emergenza		Pendimetalin (31,7%) Pendimetalin (31,7%) + Aclonifen (49%)	2 -3 1,5-2 + 1,5 - 2	
		Bentazone (40,5%)	1 - 1,5	
Post-emergenza	Dicotiledoni	Imazamox (3,7%)	1	
	Graminacee	Fluazifop-p-butile (13,3%)	1 -1,5	
		Setossidim (20%)	1 - 1,5	
		Propaquizafop (9,7%)	1	
		Alossifop R-metile estere (10,6%) Ciclossidim (10,9%)	0,7 1,5	

(1) Tra le parentesi è indicata la percentuale di s.a. nel formulato commerciale.

POMODORO

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE (1)	DOSE DI F.C. (L o KG/HA)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Pre-semina Pre-trapianto	Dicotiledoni e graminacee	Glifosate (30,4 %)	1,5-3 oppure 1-1,5 + solfato ammonico (2%)	
Pre-trapianto		Oxadiazon (25,5 %) Pendimetalin (31,7 %) Metribuzin (35 %) Aclonifen (49 %) Flufenacet (60%) S-metolacchlor (86,5)	1,5 2 – 3 0,4 – 0,5 1,5 – 2 0,8 1	
Post-emergenza Post-trapianto	Graminacee	Fenoxaprop-p-etile (6,6 %) Setossidim (20 %) Ciclossidim (21 %) Cletodim (25 %) Fluazifop p butile (13,3%) Propaquizafop (9,7 %) Quizalofop-p-etile (5%)	1-1,5 1-1,5 1-1,2 0,6 1-1,5 1 1-1,5	
	Dicotiledoni e graminacee	Metribuzin (35 %) Rimsulfuron (25 %)	0,4-0,5 0,03-0,05	

(1) Tra le parentesi è indicata la percentuale di s.a. nel formulato commerciale.

PREZZEMOLO

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE (1)	DOSE DI F.C. (L o KG/HA)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Pre-semina	Dicotiledoni e graminacee	Trifluralin (45,8%)	0,9 – 1,5	
Post-emergenza	Graminacee	Setossidim (20%)	1-1,5	

(1) Tra le parentesi è indicata la percentuale di s.a. nel formulato commerciale.

SEDANO

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE(1)	DOSE DI F.C. (L o KG/HA)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Pulizia del letto di impianto	Graminacee e dicotiledoni	Glifosate (30,4 %)	1,5-3 oppure 1-1,5 + solfato ammonico (2%)	
Pre-semina Pre-trapianto		Trifluralin (48 %)	1,5	
Post-emergenza	Graminacee annuali e perenni	Fluazifop-p-butile (13,3%) Setossidim (20%)	1 1 – 1,5	

(1) Tra le parentesi è indicata la percentuale di s.a. nel formulato commerciale.

SPINACIO

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE (1)	DOSE DI F.C. (L o KG/HA)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Pulizia del letto di impianto	Graminacee e dicotiledoni	Glifosate (30,4 %)	1,5-3 oppure 1-1,5 + solfato ammonico (2%)	
Pre-emergenza		Lenacil (80 %)	0,5-0,8	
Post-emergenza	Dicotiledoni	Fenmedifam (15,9 %)	1-1,5	
		Fenmedifam (15,9%) + Lenacil (81,48%)	1-2 + 0,3-0,5	
	Graminacee	Setossidim (20 %)	1 – 1,5	
		Propaquizafop (9,7 %)	1	
Quizalofop-p-etile (5%)		1-1,5		
		Alossifop R-metile estere (10,6%)	0,7	
		Ciclossidim (10,9%)	1,5	

(1) Tra le parentesi è indicata la percentuale di s.a. nel formulato commerciale.

ZUCCHINO

Epoca	Infestanti	Sostanze attive(1)	Dose di f.c. (l o Kg/ha)	Limitazioni d'uso e note
Pulizia del letto di impianto	Dicotiledoni e Graminacee	Glifosate (30,4%)	1,5-3 oppure 1-1,5 + solfato ammonico (2%)	(1) La dose più alta in presenza di infestanti dicotiledoni
		Glifosate trimesio (13,1%)	4-5	
		Glufosinate ammonio (11,33%)	4-7	
Pre-emergenza	Dicotiledoni e Graminacee	Clomazone 31,4% (1)	0,3 -0,4	
Post-emergenza	Dicotiledoni e Graminacee (infestanti a 2 foglie vere) localizzato sulla fila	Clomazone 31,4% (1)	0,3 -0,4	
		Graminacee	Setossidim (20%)	
			Quizalofop-p-etile (5%)	1-1,5

(1) Tra le parentesi è indicata la percentuale di p.a. nel formulato commerciale.